

营养成分表
Tableau de composition nutritionnelle

项目 Nutriments	单位 Unit	每100克 Moyenne pour 100g	每100毫升 Moyenne pour 100mL	每100千焦 Moyenne pour 100KJ
能量/Valeur énergétique	千焦/kJ	2100	289	100
蛋白质/Protéines	克/g	10.2	1.4	0.5
—乳清蛋白/ Protéines solubles	克/g	6.1	0.8	0.3
—酪蛋白/Caséine	克/g	4.1	0.6	0.2
碳水化合物/Glucides	克/g	56.3	7.7	2.68
—乳糖/Lactose	克/g	51.0	7.0	2.43
脂肪/Lipides	克/g	25.5	3.5	1.2
—亚油酸/Acide linoléique	克/g	4.054	0.557	0.193
—α-亚麻酸/ Acide α-linolénique	毫克/mg	420	58	20
花生四烯酸/ARA	毫克/mg	91.8	12.6	4.4
二十二碳六烯酸/DHA	毫克/mg	51.0	7.0	2.4
低聚半乳糖/GOS	克/g	2.70	0.37	0.13
低聚果糖/FOS	克/g	0.30	0.04	0.01
胆碱/Choline	毫克/mg	68.0	9.4	3.2
牛磺酸/Taurine	毫克/mg	31	4	1
肌醇/Inositol	毫克/mg	53.0	7.3	2.5
左旋肉碱/L-carnitine	毫克/mg	11.0	1.5	0.5
钠/Sodium	毫克/mg	150	21	7
钾/Potassium	毫克/mg	540	74	26
氯/Chlorure	毫克/mg	330	45	16
钙/Calcium	毫克/mg	490	67	23
磷/Phosphore	毫克/mg	270	37	13
镁/Magnésium	毫克/mg	42.0	5.8	2.0
铁/Fer	毫克/mg	5.00	0.69	0.24
锌/Zinc	毫克/mg	5.00	0.69	0.24
铜/Cuivre	微克/μg	320.0	44.0	15.2
锰/Manganèse	微克/μg	100.0	13.8	4.8
碘/Iode	微克/μg	100.0	13.8	4.8
硒/Sélénium	微克/μg	12.55	1.73	0.60
维生素A/Vitamine A	微克视 黄醇当量 /μg RE	381	52	18
维生素D/Vitamine D	微克/μg	6.69	0.92	0.32
维生素E/Vitamine E	毫克α-生 育酚当量 /mg α-TE	6.15	0.85	0.29
维生素K ₁ /Vitamine K ₁	微克/μg	33.0	4.5	1.6
维生素B ₁ /Vitamine B ₁	微克/μg	673	93	32
维生素B ₂ /Vitamine B ₂	微克/μg	537	74	26
维生素B ₆ /Vitamine B ₆	微克/μg	312.5	43.0	14.9
维生素B ₁₂ /Vitamine B ₁₂	微克/μg	1.1	0.151	0.05
维生素C/Vitamine C	毫克/mg	70.0	9.6	3.3
叶酸/Acide folique	微克/μg	122.0	16.8	5.8
泛酸/Acide panthénique	微克/μg	2560	352	122
烟酸/Niacine	微克/μg	3110	428	148
生物素/Biotine	微克/μg	13.0	1.8	0.6
核苷酸/Nucléotides	毫克/mg	18	2.5	0.9

配料表 · Ingrédients :

脱脂牛奶、乳糖、植物油(棕榈油、椰子油、大豆油、葵花籽油)、脱盐乳清、低聚半乳糖、麦芽糊精、浓缩乳清蛋白、磷脂、金枪鱼油、低聚果糖、碳酸钾、柠檬酸钾、磷酸三钙、花生四烯酸、动物双歧杆菌、磷酸氢二钾、氯化镁、氯化钠、L-抗坏血酸钠、酒石酸氢钾、氯化钾、肌醇、牛磺酸、硫酸亚铁、核苷酸(5-单磷酸胞苷、5-单磷酸腺苷、5-肌苷酸二钠、5-鸟苷酸二钠、5-单磷酸尿苷)、柠檬酸、磷酸铁、dl-α-生育酚、维生素A、左旋肉碱、烟酰胺、胆钙化醇、植物甲萘醌、D-泛酸钙、抗坏血酸棕榈酸酯、亚硒酸钠、D-生物素、硫酸铜、硝酸硫胺素、盐酸吡哆醇、硫酸锰、高钴胺、碘化钾、叶酸。

动物双歧杆菌Bb-12在最终产品中的含量不低于10⁸ CFU/100g。

本品含有大豆成分。

Lait écrémé ; lactose ; huiles végétales (palme, coprah, soja, tournesol) ; lactosérum déminéralisé ; galacto-oligosaccharides (GOS) ; maltodextrine ; concentré de protéines sériques riche en alphalactalbumine ; phospholipides ; huile de thon (DHA) ; fructo-oligosaccharides (FOS) ; carbonate de calcium ; citrate de potassium ; phosphate tricalcique ; huile d'acide arachidique (ARA) ; *Bifidobacterium animalis* (>10⁸ CFU/100g) ; phosphate dipotassique ; chlorure de magnésium ; chlorure de sodium ; L-ascorbate de sodium ; bitartrate de choline ; chlorure de potassium ; inositol ; taurine ; sulfate de fer ; nucléotides (cytidine-5'-monophosphate (5'CMP), adénosine-5'-monophosphate (5'AMP), inosine-5'-monophosphate disodique, guanosine-5'-monophosphate disodique, uridine-5'-monophosphate disodique) ; acide citrique ; sulfate de zinc ; DL-alpha-tocophérol ; acétate de rétinol ; L-carnitine ; nicotinamide ; cholestérol ; phytomélanine ; D-pantothénate de calcium ; palmitate de L-ascorbyle ; sélénite de sodium ; D-biotine ; sulfate de cuivre ; mononitrate de thiamine ; chlorhydrate de pyridoxine ; sulfate de manganèse ; cyanocobalamine ; iode de potassium ; acide folique. Ce produit contient des dérivés du soja.

重要提示：对于0~6月的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
Avis important : le lait maternel est l'aliment idéal du nourrisson jusqu'à 6 mois. Ce produit peut le remplacer si votre lait est insuffisant ou si vous n'êtes pas en mesure d'allaiter.

适宜人群：0~6月龄的婴儿
Lait pour nourrissons de la naissance à 6 mois
产品类型及属性：粉状乳基婴儿配方食品
Produit : lait en poudre pour nourrissons



生产日期：见罐底(年/月/日)
保质期至：见罐底(年/月/日)
产品批次号：见罐底

EXPERT Modilac[®]

萌缔爱™

DOUCÉA

Lait pour nourrissons

莫迪

婴儿配方奶粉



• FOS, GOS
低聚果糖,
低聚半乳糖,
动物双歧杆菌 Bb-12
(Chr.Hansen BB-12[®])

MADE IN FRANCE
FOR OVER 30 YEARS

0-6月龄
0-6 MOIS

净含量:900克
POIDS NET : 900G

原产国：法国
中国进口商：南京欧润特进出口有限责任公司
地址：南京市秦淮区应天大街388号B10-2
联系电话：025-51885797
生产商：LAITERIE DE MONTAIGU SAS SABOURIN
生产商厂址：LD LE PLANTY
85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU
境外乳品生产企业注册编号：
FR 85.217.001 CE
供应商：SODILAC - 68, RUE DE VILLIERS
92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX - FRANCE

更多产品信息请登陆萌缔爱官方网站：
Pour plus d'informations sur Modilac,
rendez-vous sur notre site officiel :

www.modilacchina.com

全国营养咨询热线
400-828-2198

食用方法 · COMMENT PRÉPARER LE BIBERON DE BÉBÉ

为了您孩子的健康，我们重要提示：
• 为了您孩子的健康，请严格遵守奶粉冲调方法。
• 奶粉即冲即食。
• 请使用本品自带的量匙盛取奶粉。
• 奶粉冲调后及时食用，瓶中未喝完的奶请倒掉。
• 不当配调和和使用不当本产品可能会影响婴儿的健康。

Recommandations importantes pour la santé de votre bébé :
• Pour la santé de votre bébé, suivez les conseils d'utilisation attentivement.
• Préparez le biberon immédiatement avant emploi.
• Utilisez uniquement la mesure fournie dans la boîte.
• Utilisez le biberon immédiatement après préparation.
Ne jamais conserver le lait restant.
• Une mauvaise préparation peut rendre votre bébé malade.

请咨询医务工作者，以便根据孩子需要，确定适合的单次食量和喂食次数。
Suivez les recommandations de votre pédiatre pour adapter le volume et le nombre de biberons aux besoins de votre bébé.

冲调方法 · Préparation du biberon

- 1- 冲调奶粉前，请洗净双手；仔细清洗奶瓶和附件，并在沸水中消毒晾干后倒入所需的水的量（水煮沸后冷却至40摄氏度）。
Avant de préparer le biberon, lavez-vous soigneusement les mains. Nettoyez soigneusement et stérilisez le biberon, le bouchon et le tétine. Versez dans le biberon la quantité d'eau bouillie nécessaire (eau faiblement minéralisée tiédie à 40°C).
- 2- 请使用本品自带量勺盛取奶粉，沿奶粉罐口边缘刮至平勺即可。
Remplissez de poudre la mesurette présente dans la boîte, puis arasez-la sur le rebord de la boîte prévu à cet effet.
- 3- 加入相应勺数的奶粉，1勺奶 粉配30毫升的水。Ajoutez le nombre correspondant de mesurettes rases de poudre dans l'eau en respectant bien la proportion : 1 mesurette dans 30 ml d'eau.
- 4- 将奶瓶盖盖紧，并轻轻晃动，然后上下的摇晃直至奶粉完全溶解。请在手腕内侧倒几滴牛奶以确认牛奶温度适中(37°C-38°C)。
Bouchez le biberon et agitez-le vigoureusement. Contrôlez la température en versant quelques gouttes sur votre poignet (37°C-38°C).

1勺(4.6克)约配30毫升水
1 mesurette (4,6 g) = 30 ml d'eau

年龄 Age de bébé	水 (mL) Quantité d'eau par biberon (ml)	勺数 Nombre de mesurettes par biberon	24小时喂 哺次数 Nombre de biberons par 24 h
0-1个月 (0 à 1 mois)	90	3	6
1-2个月 (1 à 2 mois)	120	4	6
2-3个月 (2 à 3 mois)	150	5	5
3-4个月 (3 à 4 mois)	180	6	5
4-5个月 (4 à 5 mois)	210	7	4
5-6个月 (5 à 6 mois)	240	8	4

贮藏条件：Conditions de stockage
将奶粉放在干燥、阴凉的地方。
注意事项：开封盛取奶粉后及时盖紧盖子避免受潮。
请在奶粉开封后4周内食用完毕。
Conservez la boîte à l'abri d'une source de chaleur. Fermez la boîte à l'aide du couvercle plastique et conservez-la dans un endroit frais et sec. Utilisez la poudre dans un délai de 4 semaines.